

Prilog:

Ljudi koji su definisani kao klinički izuzetno osjetljivi/ranjivi imaju vrlo visok rizik od teške bolesti od novog koronavirusa i kao takvi svrstani su u izuzetke od opšteg pravila o primjeni treće doze (treća doza se može primijeniti već dva mjeseca nakon druge doze uz poštovanje prethodno jasno definisanih pravila).

Postoje dva načina na koji se neko lice može identifikovati/determinisati kao klinički izuzetno osjetljivo/ranjivo:

1. Ima jedan ili više dolje navedenih uslova ili
2. Njegov izabrani doktor/kliničar koji ga liječi i prati ga je dodao na listu pacijenata koje treba posebno štititi jer na osnovu njihove kliničke procjene smatra(ju) da je u većem riziku od ozbiljne bolesti ako se inficiraju sa SARS-CoV-2.

Osobe sa sljedećim stanjima automatski se smatraju klinički izuzetno ranjivima

- primaoci transplantacija čvrstih organa
- osobe sa određenim vrstama malignih neoplazmi
 - ljudi s malignom neoplazmom koji su podvrgnuti aktivnoj hemoterapiji
 - ljudi s malignom neoplazmom pluća koji su na radikalnoj radioterapiji
 - ljudi s malignim neoplazmama krvi ili koštane srži poput leukemije, limfoma ili mijeloma koji su u bilo kojoj fazi liječenja
 - ljudi koji su na imunoterapiji ili drugoj vrsti kontinuiranog tretmana antitijelima u cilju liječenja maligne neoplazme
 - ljudi koji imaju druge oblike ciljanih tretmana za maligne neoplazme a koji mogu uticati na imuni sistem, poput inhibitora protein kinaze ili PARP inhibitora
- ljudi koji su imali transplantaciju koštane srži ili matičnih ćelija u posljednjih 6 mjeseci ili koji još uvijek uzimaju/primaju imunosupresivnu terapiju
- ljudi s teškim respiratornim stanjima, uključujući cističnu fibrozu, tešku astmu i tešku hroničnu opstruktivnu bolest pluća (HOBP)
- osobe s rijetkim bolestima koje značajno povećavaju rizik od infekcija (poput teške kombinovane imunodeficijenije (SCID), homozigotne bolesti srpastih ćelija)
- ljudi na imunosupresivnoj terapiji koja je dovoljno snažna da značajno povećava rizik od infekcije
- problemi sa slezinom, na primjer splenektomija
- odrasle osobe s Down-ovim sindromom
- odrasle osobe koje su na dijalizi ili imaju hroničnu bolest bubrega (stadijum 5)
- žene koje su trudne sa značajnim srčanim bolestima, urođenim ili stečenim